



Sociedad Norte
del Dolor

1° APELLIDO _____
2° APELLIDO _____
NOMBRE _____
FECHA _____ N° HISTORIA _____

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO ESTRELLADO

EN QUÉ CONSISTE EL BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO ESTRELLADO

El bloqueo del ganglio estrellado consiste en interrumpir la inervación simpática del brazo y de la cara mediante la inyección de un anestésico local en la parte anterior del cuello al lado de la tráquea. Se colocará en la mesa tumbado boca arriba. Se realiza un pequeño pinchazo para anestesiar la piel, inyectando una pequeña cantidad de anestesia local y se introduce una aguja fina hasta localizar la zona adecuada. En algunas ocasiones puede ser necesario utilizar pequeñas cantidades de contraste radiológico para comprobar la situación de la aguja, por lo que si es alérgico al contraste o ha tenido algún problema en alguna exploración radiológica comuníquelo a su médico. Una vez colocada correctamente la aguja se procede a inyectar el anestésico local. Este bloqueo se puede realizar mediante control ecográfico, por lo que no será necesario el contraste radiológico.

Los efectos que usted notará son:

- Enrojecimiento del ojo del mismo lado de la punción, acompañado de caída del párpado superior y disminución del tamaño de la pupila.
- En algunas ocasiones se puede producir anestesia del brazo del mismo lado, con dificultad para moverlo.

Estos efectos desaparecen una vez pasada la acción del anestésico, normalmente unas tres o cuatro horas, aunque en algunos pacientes puede ser más prolongado.

COMPLICACIONES FRECUENTES DEL BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO ESTRELLADO

Las complicaciones del Bloqueo del Ganglio estrellado son raras.

Las más frecuentes son:

- Hematoma (acúmulo de sangre), por punción de alguno de las venas o arterias del cuello, suelen ser pasajeros y desaparecer con compresión de la zona.
- Ronquera por paralización de los nervios laríngeos, también es pasajera y no requiere tratamiento.

Muy poco frecuentes, pero más graves son:

- La aparición de un neumotórax; entrada de aire en la cavidad pleural, se manifiesta por dolor intenso en el tórax en el lado de la punción. En ocasiones puede precisarse la colocación de un tubo de drenaje para tratarlo. Es muy raro.
- Que el anestésico inyectado pase a una de las venas o arterias del cuello, pudiendo provocar pérdida de conciencia, convulsiones y coma.
- Paso del anestésico al líquido cefalorraquídeo a nivel del cuello, se produce una anestesia espinal completa con pérdida de conciencia y parada respiratoria.

Estas dos últimas complicaciones requerirían medidas de reanimación, como intubación y ventilación mecánica durante unas horas.

RIESGOS PERSONALIZADOS

Estos riesgos están relacionados con el estado de salud previo del paciente, y los más significativos son:

.....
.....
.....

DECLARO que he sido informado/a por el médico de los riesgos del BLOQUEO DEL GANGLIO ESTRELLADO, y sé que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento.

ESTOY SATISFECHO/A con la información recibida, he podido formular todas las preguntas que he creído convenientes y me han aclarado todas las dudas planteadas.

En consecuencia, DOY MI CONSENTIMIENTO para que se me realice el Bloqueo del Ganglio Estrellado.

Firma del paciente

Firma del médico

Dr. D. _____

.....

.....

Nombre del representante legal, en caso de incapacidad del paciente, con indicación del carácter con el que intervienen (padre, madre, esposo/a, tutor, etc.)

Firma DNI

REVOCACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZACIÓN DEL BLOQUEO ANESTÉSICO DEL GANGLIO ESTRELLADO

Revoco el consentimiento para la realización del Bloqueo del Ganglio Estrellado.

Firma del paciente

Fecha